

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 26-3-69 907425

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION ~~REDACTED~~ ANGERS
(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, ~~REDACTED~~ VENDEE, DEUX-SÈVRES, VIENNE) MAYENNE
~~REDACTED~~
C. C. P. Nantes 86-04-02 Régisseur de recettes de la D. D. A. de M. & L. Cité Administrative, rue Dupetit Thouars ANGERS

Tél. 88-30-34

88-06-15

Poste 571

ABONNEMENT ANNUEL

25 F.

SUPPLEMENT N° 2 au BULLETIN N° 102 de MARS 1969

DEUX-SÈVRES (y compris la région de la Gâtine)
LOIRE ATLANTIQUE - MAINE-et-LOIRE - VENDEE - VIENNE..... p. 12

AVERTISSEMENTS

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER - Sur les variétés à débourrement précoce traitées conformément à la note du 14 Mars, la végétation s'est accrue et les pluies ont pu éliminer la protection. D'autre part les projections d'ascospores augmentent et les conditions climatiques demeurent très favorables. En conséquence, sur ces variétés, effectuer une nouvelle application dès les tout premiers jours de la semaine du 24 au 29 Mars. Sur les variétés à débourrement tardif, intervenir au fur et à mesure que le stade C3 D sera atteint.

Dans la région de la Gâtine dans les Deux-Sèvres, les premières projections sont commencées et les variétés à débourrement précoce atteignent actuellement un stade sensible. Sur les variétés ayant atteint le stade C3 D, il y a donc lieu d'effectuer un traitement immédiat. Sur les autres variétés attendre que ce stade soit atteint pour intervenir.

TAVELURE DU POMMIER - Il est rappelé que les projections d'ascospores sont également commencées et que la protection doit être assurée dès que le stade C3 D est atteint.

Dans la région de la Gâtine dans les Deux-Sèvres, attendre de nouvelles informations pour intervenir.

Contre ces deux tavelures, utiliser l'un des fongicides conseillé dans l'édition spéciale.

IMPORTANT

Il est rappelé que tout traitement éliminé par la pluie doit être renouvelé immédiatement sans attendre un avis de la Station.

INFORMATIONS.

OIDIUM DU POMMIER - Les premiers germes sont formés. Sur les variétés sensibles, profiter du traitement dirigé contre la tavelure pour assurer la protection contre cette affection.

PUCERON VERT DU POMMIER - Les premiers foyers sont apparus. Dans les vergers où des dégâts ont été observés en 1968 et où de la fumagine a été notée sur les rameaux au cours de la taille, profiter du traitement anti-tavelure pour ajouter un produit aphicide à la bouillie.

ANTHONOME DU POMMIER - Dans la région de la Gâtine dans les Deux-Sèvres, il y a lieu d'intervenir contre cet insecte dans les vergers où des dégâts ont été observés en 1968.

CHANCRE COMMUN DU POMMIER - Dans la région de la Gâtine dans les Deux-Sèvres, effectuer une pulvérisation cuprique dans les vergers situés dans des expositions sensibles à cette affection.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux:
J. DIXMERAS

Les Contrôleurs chargés des Avertissements
agricoles:

R. GEOFFRION - J. BOUCHET

TIRAGE DU 21 MARS 1969.